



emcdda.europa.eu

## REZUMAT — EXTRAS:

### Tendențe în ceea ce privește consumul de droguri injectabile în Europa

#### Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie

Embargo: 00:00 CET — 24.06.2010

#### Introducere

Prezentul „Extras” vizează situația actuală a consumului de droguri injectabile în Europa. În ansamblu, raportul este structurat pe baza a două întrebări: Care este prevalența și care sunt tendințele în ceea ce privește consumul de droguri injectabile în prezent, în Europa? Cum încearcă țările europene să prevină sau să reducă acest tip de consum și riscurile asociate acestuia?

Pentru a se estima prevalența și tendințele în privința consumului de droguri injectabile în Europa, au fost analizate date provenind din mai multe surse. Potrivit celor mai recente date, consumul de droguri injectabile a rămas stabil sau a scăzut în majoritatea țărilor europene. Măsurile precum tratamentul de substituție pentru opiacee și programele de schimb de seringi, care au ca scop reducerea riscurilor asociate consumului de droguri injectabile, au devenit acum disponibile multora dintre persoanele care au nevoie de acestea.

#### Estimări privind prevalența

- Estimările naționale privind numărul consumatorilor de droguri injectabile, disponibile pentru 14 țări variază până la 15 consumatori de droguri injectabile la mia de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani, ceea ce sugerează diferențe considerabile în ceea ce privește prevalența între țări.
- Pentru cele 12 state membre ale UE care au prezentat estimări ale prevalenței, media ponderată este de aproximativ 2,5 consumatori de droguri injectabile la mia de locuitori cu vârste între 15 și 64 de ani. Extrapolată la întreaga Uniune Europeană, aceasta corespunde unei valori între aproximativ trei sferturi de milion și un milion de consumatori activi de droguri injectabile.
- Cinci țări au putut furniza date pentru a se evalua tendința prevalenței injectării între 2002 și 2007. Deși se pot observa scăderi în trei dintre aceste țări, doar în **Regatul Unit** schimbarea a fost semnificativă din punct de vedere statistic.

#### Consumatorii de droguri care încep un tratament

- Douăzeci și șase de țări europene au prezentat date privind consumatorii de droguri care au început un tratament într-un centru specializat în 2007. Este posibil ca datele privind persoanele care au început un tratament să nu fie reprezentative pentru populația tratată în ansamblu.
- Treime (33%) din toate persoanele care au început un tratament în 2007 au raportat injectarea drept cale curentă de administrare a principalului drog consumat. Proporția celor care au raportat că „de obicei consumă drogul principal prin injectare” variază de la mai puțin de 2%, în **Țările de Jos**, la 93 %, în **Lituania**.
- Aproximativ un sfert dintre persoanele care au început un tratament raportează că au consumat droguri injectabile în trecut, însă nu mai consumă în prezent. Astfel, aproximativ 60% dintre persoanele, care au început un tratament, consumă în prezent sau au consumat în trecut droguri injectabile.
- Consumul de droguri injectabile în Europa este în mare parte legat de consumul de opiacee. În medie, 45% dintre persoanele care încep un tratament pentru consum principal de opiacee, raportează de obicei injectarea drogului respectiv. Printre consumatorii pentru care cocaina reprezintă drogul principal de consum și care apelează la tratament, 8% raportează, de regulă, injectarea ca și cale de

RO — Embargo: 00:00 CET — 24.06.2010

administrare. În țările în care cel mai mare grup de consumatori care apelează la tratament este format din consumatorii de amfetamine, între 41% și 83% dintre consumatorii având ca drog principal de consum, amfetamina (**Finlanda, Suedia**) sau metamfetamina (**Republica Cehă, Slovacia**), raportează că de obicei consumă drogul prin injectare.

- Între anii 2002 și 2007, printre persoanele care au început pentru prima dată un tratament pentru opiacee, cocaină sau amfetamină, proporția celor care raportează consumul drogului principal prin injectare a scăzut în majoritatea țărilor.
- Datele privind persoanele care au început pentru prima dată un tratament între 2002 și 2007 sugerează o tendință descrescătoare în ceea ce privește injectarea în rândul consumatorilor pentru care cocaina reprezintă drogul principal de consum și o tendință stabilă în rândul consumatorilor de amfetamină.

### **Injectarea în închisoare**

- În funcție de țară, între 6% și 38% dintre deținuți raportează injectarea ca și cale de administrare a drogului. Injectarea drogurilor în închisoare este raportată de un procent între 1% și 31% dintre deținuți.

### **Date privind bolile infecțioase**

- Testarea persoanelor care consumă droguri injectabile pentru depistarea bolilor infecțioase asociate acestuia, indică faptul că, în unele țări, într-o proporție ridicată, aceștia consumă droguri injectabile de mai puțin de doi ani, ceea ce sugerează în mai multe țări proporții ridicate de persoane care au început să consume recent droguri și proporții ridicate de consumatori de droguri injectabile cu vârste sub 25 de ani.
- În statele membre ale UE, ratele cazurilor raportate de infecție cu HIV diagnosticate recent în rândul consumatorilor de droguri injectabile se situează la niveluri în cea mai mare parte stabile și scăzute sau în scădere.
- Între țările vecine Uniunii Europene, ratele din ce în ce mai mari de cazuri de infectare cu HIV raportate și atribuite consumului de droguri injectabile sugerează proporții ridicate ale folosirii în comun a echipamentului de injectare.

### **Tendințe în ceea ce privește decesele determinate de consumul de droguri în Europa**

- Deoarece injectarea heroinei este implicată în multe dintre decesele provocate de supradoza de droguri, datele privind decesele determinate de consumul de droguri permit concluzii referitoare la prevalența și tendințele consumului de droguri injectabile.
- Datele din anul 2007 arată că în 5 din 18 state membre ale UE există o tendință stabilă în ceea ce privește numărul de decese determinate de consumul de droguri, însă în 13 dintre aceste țări există o tendință ascendentă.
- Analiza cazurilor de deces ca urmare a aconsumului de droguri în funcție de vârstă sugerează că numărul utilizatorilor tineri de heroină se stabilizează sau chiar este în scădere în majoritatea țărilor. Cu toate acestea, în mai multe țări, datele indică recrutarea continuă de tineri consumatori de droguri, în special de consumatori de heroină injectabilă.

### **Intervenții pentru combaterea consumului de droguri injectabile**

- În țările europene, răspunsurile la consumul de droguri injectabile și la consecințele acestuia s-au axat în primul rând pe tratamentul consumului, în special pe tratamentul de substituție pentru opiacee, care reprezintă cea mai eficace intervenție pentru reducerea consumului de droguri injectabile.
- În 2007, în Uniunea Europeană, numărul estimat al persoanelor care urmau un tratament de substituție era de 650 000, reprezentând aproximativ 40% din numărul total estimat al consumatorilor problematici de opiacee. Numărul persoanelor care urmau în 2007 un tratament de substituție reprezintă o creștere de cel puțin trei ori comparativ cu anul 1995.

- Datele prezentate de zece țări arată variații mari în ceea ce privește proporția de consumatori problematici de opiacee care ar putea avea acces la un tratament de substituție pentru opiacee: de la 5% în **Cipru**, la peste 50% în **Germania**.
- În toate statele membre ale UE, precum și în Croația și Norvegia, există programe de schimb de seringi, care au ca scop reducerea riscului apariției bolilor infecțioase asociate utilizării în comun a echipamentului de injectare, în majoritatea țărilor, nivelul disponibilității acestor programe fiind ridicat.
- Între 2003 și 2007, numărul total de seringi distribuite a crescut cu 33% în cele 14 țări care au putut furniza informații.
- Pe întreg teritoriul Uniunii Europene, se estimează că punctele specializate de distribuție a seringilor — fără a include vânzările din farmacii — distribuie în medie aproximativ 50 de seringi pe an per consumator de droguri injectabile.